

Tratamentul in cazul iritatiilor virale si bacteriane

By *george*

Created 10/22/2009 - 15:08

Cu siguranta fiecare dintre noi s-a confruntat cu aparitia bolilor copilariei, care indiferent de originea bacteriana sau virala, s-au manifestat prin aparitia unor iritatii la nivelul pielii. Ceea ce trebuie sa stiti insa este faptul ca in prezent sunt descoperite tot mai multe vaccinuri care au capacitatea de a ne proteja de aparitia acestor conditii medicale. Chiar si asa insa este foarte important sa tratam orice tip de iritatie cu importanta necesara.

1. Varicela

Aceasta boala contagioasa este provocata de virusul numit varicela zoster, si desi nu este o afectiune periculoasa simptomatologia ei se manifesta pentru o perioada de 2 saptamani. Cu toate acestea varicela poate crea complicatii in cazul persoanelor cu un sistem imunitar slabit, a celor ce urmeaza chimioterapie, a femeilor insarcinate, a celor ce urmeaza un tratament pe baza de steroizi, sau a persoanelor diagnosticate cu virusul HIV. Deasemenea trebuie sa stiti ca vaccinul trebuie administrat copiilor cu o varsta mai mica de 1 ani. Varicela se manifesta intr-un interval de 10-20 de zile de la momentul in care pacientul a fost expus virusului.

Simptomatologia:

- in prima faza varicela se manifesta prin aparitia la nivelul pielii a unei iritatii insotite de o senzatie severa de mancarime, de cele mai multe ori la nivelul scalpului, al zonei axiale si abdomenului care se extinde progresiv pe toata suprafata corpului;
- iritatie apare sub forma unei zone rosii cu o basicalta mica, superficiala in centru, care pe masura ce boala progresa se sparge formand o crusta;
- alte simptome ale varicelei includ manifestari precum febra usoara, stari de indispozitie, inflamarea amigdalelor sau inrosirea ochilor.

Tratament

- in prima faza a bolii virusul poate fi transmis la nivelul narilor si a gurii copilului, insa trebuie sa stiti ca si iritatie este contagioasa;
- avand in vedere ca pana in prezent nu a fost descoperit un tratament pentru varicela, de cele mai multe ori medicul specialist va va oferi anumite indicatii astfel incat copilul dumneavoastra sa se simta cat mai confortabil pe toata perioada bolii;
- tratamentul pe baza de aspirina este contraindicat in aceasta perioada. Astfel studiile de specialitate au putut demonstra legatura dintre administrarea acestui produs medicamentos si dezvoltarea in organism a unei boli fatale numita sindromul Reye. Deasemenea este extrem de important sa cititi cu atentie prospectele tuturor medicamentelor achizitionate fara prescriere medicala, deoarece aspirina si salicilatele in general intra in compozitia unei game largi de produse medicamentoase pentru raceala si gripa.

2. Rujeola

Rujeola este cauzata de un virus din familia piramixovirus. Desi in prezent pe piata exista un vaccin pentru aceasta conditie medicala, de cele mai multe ori persoanele ce nu au fost vaccinate corespunzator contacteaza acest virus mai devreme sau mai tarziu.

Simptomatologia

- manifestarile specifice primei faze a rujeolei cuprind congestie nazala, inrosirea, inflamatie si lacrimarea ochilor, tuse, letargie si febra;
- in cea de-a treia sau a patra zi de manifestare a rujeolei, la nivelul fetei copilului va apare o iritatie rosie, care se va extinde repede pe intregul corp. Aceasta manifestare va disparea intr-un interval de 7 zile;
- un alt simptom des intalnit in cazul copiilor cu rujeola este reprezentat de aparitia unor pete albe pe gingie.

Tratament

- odata ce simptomele incep sa se manifeste trebuie sa stiti faptul ca singurul tratament ce poate fi administrat este acela pentru ameliorarea tusei , a manifestarilor de la nivelul ochilor, sau a febrei;
- si in acest caz aspirina este contraindicata pentru copii, deoarece poate duce la dezvoltarea sindromului Reye, o boala letala;
- in unele cazuri copii dezvolta infectii bacteriene secundare la nivelul urechii mijlocii, a sinusurilor, plamanilor si a nodurilor limfatice, caz in care medicul specialist va dispune administrarea unui tratament pe baza de antibiotice;
- durata de actiune a rujeolei este de 7 pana la 10 zile, iar simptomatologia tinde sa se amelioreze pe masura ce boala se vindeca;
- pentru a preveni contactarea acestui virus, de cele mai multe ori copii sunt vaccinati in intervalul de varsta 12-15 luni, in cadrul programului de vaccinare impotriva rujeolei, oreionului si a rubeolei (pojar german). Acest vaccin trebuie repatat la 4-6 ani, precum si la 11-12 ani.

3. rubeola (pojar german)

Rubeola este o conditie medicala blanda cauzata de un virus, numit rubivirus. Cu toate acestea daca este contactata in timpul perioadei de incubatie rubeola poate constitui o conditie medicala severa ce duce adesea la manifestari precum pierderea auzului, anomalii ale inimii, afectiuni la nivelul ochilor sau retard mental.

Simptomatologia la copii

- in prima faza rubeola se manifesta sub forma unei iritatii roz sau rosii la nivelul fetei, care se extinde gradual pe intregul corp, urmand sa dispara intr-un interval de 4 zile;
- deci copilul poate sa nu para grav bolnav, exista situatii in care nodulii limfatici se pot inflama (cu precadere cei din spatele urechii).

Tratament

- in prezent exista pe piata o forma eficienta de vaccinare impotriva rubeolei sau a pojarului german;
- aceasta conditie medicala poate avea urmari serioase asupra unui fat daca mama contacteaza acest virus in primul trimestru de sarcina. Tocmai din acest motiv este recomandat ca toate viitoarele mamici sa isi testeze sistemul imunitar inainte de aducerea pe lume a unui copil.

4. Scarlatina

Scarlatina este o boala contagioasa provocata de o bacterie din familia streptococilor, manifestata in prima instanta la nivelul amigdalelor. Desi de cele mai multe ori scarlatina are o incidenta mai mare in randul copiilor de pana la 10 ani, iarna si primavara devreme, aceasta conditie medicala poate fi contactata si de persoanele adulte. Mai multe decat atat, avand in vedere gradul de contagiozitate ridicat este foarte important sa diminuati riscul expunerii la aceasta bacterie spalandu-va foarte bine pe maini. Deasemenea desi iritatiea care apare in cele din urma pe toata suprafata corpului nu este extrem de grava, medicii specialisti sunt adesea ingrijorati in privinta efectelor secundare severe, precum febra reumatica. Aceasta conditie medicala are capacitatea de a afecta valvele inimii, ducand la aparitia unor boli si afectiuni ale inimii.

Simptomatologia

- la copii simptomele scarlatinei includ manifestari precum dureri in gat, febra, dureri de cap, dureri abdominale, precum si inflamarea glandelor de la nivelul gatului;
- la un interval de 1-2 zile de la dezvoltarea acestor simptome, pe corpul copilului va aparea o iritatie rosie cu textura similara smirghelului;
- aceasta iritatie se manifesta si la nivelul fetei, buzele, si pielea din dreptul buzelor isi vor pastra textura normala.

Tratament

- bacteria din familia streptococilor poate fi cu usurinta tratata prin administrarea antibioticelor;
- adresati-va imediat medicului specialist daca banuiti ca bebelusul sau copilul dumneavoastra dezvolta semnele acestei conditii medicale;
- este recomandat ca pacientul sa urmeze tratamentul cu antibiotice pana la capat chiar daca boala pare sa se vindecat si copilul se simte mai bine;
- copilul dumneavoastra se poate intoarce la scoala intr-un interval de 24 de ore de la ultima manifestare a simptomelor.

5. Boala a cincea (eritemul infectios)

Boala a cincea, eritemul infectios sau boala „obrajilor palmuiti” asa cum este ea cunoscuta in terminologia medicala este o afectiune virala cauzata de parovirusul B19. Gradul de manifestare al acestei boli pare sa fie mai mare in sezonul rece (iarna) precum si primavara, conform studiilor statistice.

Simptomatologie

- in prima faza de dezvoltare copilul de simte rau si obosit, dupa care, la scurt timp, la nivelul fetei va aparea o iritatie, caracterizata prin inrosirea obrazilor. Deasemenea aceasta iritatie este fierbinte la atingere, nu prezinta sensibilitate insa in anumite cazuri aceasta poate sa fie caracterizata de macarimi;
- intr-un interval de 1-2 zile la nivelul intregului corp va aparea o iritatie cu aspect dantelat. Desi aceasta iritatie pare sa dispara la temperaturi scazute, ea va reaparea in timpul unei bai fierbinti sau daca persoana in cauza va depune efort fizic;
- odata ce iritatia aparut copilul nu mai este contagios.

Tratament

- desi a cincea boala nu este o conditie medicala grava, aceasta poate pune probleme serioase in cazul copiilor diagnosticati cu anemia celulelor in forma de secera, leucemie sau SIDA;
- aceasta conditie medicala poate duce la manifestari severe in cazul femeilor insarcinate;
- este bine ca pacientul diagnosticat cu a cincea boala sa nu vin in contact cu prea multa lumea pana in momentul in care iritatia de pe corp apare. Din acel moment boala inceteaza sa mai fie contagioasa.

6. Rujeola infantila

Rujeola infantila (exanthem subitum) este o boala obisnuita a copilarii provocata de virusul herpes 6 si 7. Conform studiilor statistice incidenta cea mai mare a acestei boli se manifesta la copii de pana la 4 ani.

Simptomatologia

- simptomatologia acestei conditii medicale este caracterizata de febra mare timp de 8 zile, urmata de aparitia iritatiei la nivelul pielii;
- iritatia specifica acestei boli este caracterizata prin pete mici, plate (sau foarte usor proeminente) de culoare roz, aparuta cu preponderenta la nivelul trunchiului si al extremitatilor.

Tratament

- in ciuda febrei ridicate ce poate pune multi dintre parinti pe ganduri, aceasta conditie medicala nu este severa si nici nu necesita un tratament corespunzator;
- daca medicul specialist va considera ca este cazul puteti sa ii administrati copilului dumneavoastra un tratament pe baza de acetaminofen pe toata perioada febrei;
- aspirina, laturi de toate produsele pe baza de aspirina trebuie evitate in aceasta perioada, in caz contrar existand riscul aparitiei sindromului Reye;
- exista situatii in care febra asociata rujeolei infantile poate duce la aparitia unor atacuri de apoplexie, si prin urmare este recomandat sa va adresati imediat medicului de familie sau medicului specialist.

7. Virusurile coxsackie si alte enterovirusuri

Enterovirusurile, incluzand in aceasta categorie si virusurile coxsackie, reprezinta o cauza frecventa de aparitie a iritatiilor si febrei la copii. In ceea ce priveste virusurile coxsackie, acestea sunt responsabile de 2 conditii medicale numite boala mana-picior-gura si herpangina. Deasemenea aceste infectii au un grad de incidenta mai ridicat vara si toamna.

Simptomatologia

- in ceea ce priveste boala mana-picior-gura, simptomatologia include manifestari precum febra si iritatie, manifestata prin aparitia unor basicuti la nivelul cavitatii bucale si a limbii, precum si la nivelul mainilor si a picioarelor;
- in cazul diagnosticului cu herpangina simptomatologia se manifesta prin febra, dureri in gat si aparitia unor basicuti sau ulceratii dureroase in spatele limbii, fapt ce va provoca dificultati de inghitire. Deasemenea in cazul copiilor acestia pot resimti adesea pierderea poftei de mancare,

dureri abdominale, si arareori ulceratii vaginale.

Tratamentul

- tratamentul pentru boala mana-picior-gura nu a putut fi inca stabilit cu exceptia acetaminofenului si a ibuprofenului, ambele administrate pentru febra. Deasemenea este foarte important ca parintii sa fie foarte atenti pentru a nu administra copiilor aspirina, deoarece acest medicament poate duce la dezvoltarea sindromului Reye, fatal in cele mai multe dintre cazuri;
- desi aceste 2 conditii medicale nu sunt severe si nici nu pun viata pacientului in pericol, ele pot fi prevenite atat timp cat pastrati o igiena riguroasa a mainilor.

8. Impetigo

Impetigo este o conditie medicala ce se manifesta printr-o infectie superficiala a pielii cu o bacterie stafilococica sau streptococica. De cele mai multe ori acesta infectie apare la nivelul nasului si a gurii insa se poate manifesta in orice alta zona a corpului. Deasemenea trebuie sa stiti faptul ca impetigo se manifesta cu precadere in lunile calde, si poate aparea ca reactie aditionala ale unor leziuni ale pielii precum scabie, otravire cu iedera, eczeme sau reactii la anumite medicamente.

Simptomatologie

- in prima faza de evolutie impetigo se manifesta prin aparitia unor basicute mici, care odata ce pocnesc lasa pielea rosie si sub forma unei rani deschise;
- de multe ori in locul basicutelor se formeaza o crusta de culoarea mierii;
- iritatie este insotita de o senzatie acuta de mancarime;
- impetigo este extrem de contagioasa, si prin urmare copilul poate sa raspandeasca iritatiea atat catre alte parti ale copului cat si catre alti oameni.

Tratament

- impetigo poate fi usor de tratat prin administrarea unei medicatii topice sau antibiotice orale;
- in mod normal contagiozitatea bolii dispare la un interval de 2-3 zile de la inceperea tratamentului. Deasemenea iritatiea incepe sa se vindece la un interval de 3-5 zile;
- daca iritatiea nu da semne de vindecare dupa a treia zi de tratament, etse indicat sa va adresati imediat medicului specialist;
- daca impetigo se manifesta ca urmare a altor conditii medicaloe, precum otravirea cu iedera sau scabie, este recomandata administrarea unei medicatii pentru ameliorarea mancarimilor.

Source URL: <http://www.i-medic.ro/primul-ajutor/tratamentul-cazul-iritatiilor-virale-si-bacteriane>